น้ำยาจระเข้
ทำความสะอาดทั่วไป
Crocodile General Cleaner

จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

ทำความสะอาดทั่วไป



คุณสมบัติ
สามารถใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด ทั้งชนิดผิวขัดมัน และไม่ขัดมัน ใช้ทำความสะอาดได้ทั่วไปเป็นประจำได้ทุกวัน หรือใช้ขจัดคราบสกปรกฝังแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกบริเวณของบ้านที่มีคราบสกปรก อีกทั้งยังช่วยรักษาพื้นผิวให้มีความเงางามอีกด้วย

ข้อแนะนำการใช้

อัตราส่วนผสม

สำหรับทำความสะอาดคราบติดแน่น	ผสมน้ำในอัตรา 1 : 2
สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำ	ผสมน้ำในอัตรา 1 : 5
สำหรับทำความสะอาดทั่วไป	ผสมน้ำในอัตรา 1 : 10
สำหรับทำความสะอาดประจำวัน	ผสมน้ำในอัตรา 1 : 50

การใช้งาน
กรณีใช้ขจัดคราบฝังแน่น ไม่ต้องผสมน้ำ

1. โดยหยดน้ำยาลงบริเวณเฉพาะที่เป็นคราบฝังแน่นทิ้งไว้ประมาณ 1 - 2 นาที
2. ใช้ฟองน้ำหรือ แปรงขนอ่อนขัดบริเวณที่เป็นคราบฝังแน่นจนคราบหลุดออก
3. เช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง

www.Jorakay.co.th

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :
102 ซ.พระรามเก้า 43 (เสรี 4) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386

น้ำยาจระเข้
ทำความสะอาดทั่วไป
Crocodile General Cleaner

จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

Dipropylene glycol monomethyl ether	3 - 7 %
Sodium Metasilicate Pentahydrate	1 - 5 %
Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate	1 - 5 %
PH.12	

ข้อควรระวัง

- ควรทดสอบประสิทธิภาพในพื้นที่เล็กๆ ก่อน
- สวมถุงมือและแว่นป้องกันตลอดเวลา
- ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- **ทางการเข้าตา** ล้างตาด้วยน้ำเปล่าจำนวนมากทันที และกรอกตาขึ้นลง หากใส่คอนแทคเลนส์ ควรถอดอย่างระมัดระวัง และล้างตาด้วยน้ำเปล่าต่ออย่างน้อย 20 นาที และควรปรึกษาแพทย์
- **ทางการสูดดม** เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่โล่งและอากาศถ่ายเท หากยังมีควันฟุ้งจากสารเคมี ควรสวมใส่หน้ากาก ในกรณีหมดสติ ควรจัดท่าทางผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสม ปลดกระดุมเสื้อหรือเนคไทด์ ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในสถานที่ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเท และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที
- **ทางผิวหนัง** ล้างสิ่งปนเปื้อนจากผิวหนังด้วยน้ำจำนวนมาก ล้างสารที่ปนเปื้อนเสื้อผ้าด้วยน้ำ และควรสวมถุงมือ ควรล้างน้ำเป็นระยะเวลา 20 นาที ซักเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนนำมาสวมใส่
- **ทางปาก** ล้างปาก ถอดฟันปลอมหากมี และดื่มน้ำตามในปริมาณพอสมควร และควรหยุดหากผู้ป่วยมีอาการอยากอาเจียน หากผู้ป่วยมีอาการอาเจียน ควรจัดท่าให้ศีรษะอยู่ต่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ปอด ไม่ควรนำสิ่งต่างๆใส่ปากผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีอาการหมดสติ ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศปลอดโปร่งและถ่ายเท ปลดกระดุมเสื้อ และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที

การเก็บรักษา

เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ควรจัดเก็บให้พ้นแสงแดด สามารถจัดเก็บที่อุณหภูมิห้อง

การบรรจุ

ขนาด	พื้นที่ (ไม่ผสมน้ำ)
0.5 ลิตร	10 ตร.ม.
3.0 ลิตร	60 ตร.ม.
10.0 ลิตร	200 ตร.ม.
20.0 ลิตร	400 ตร.ม.