น้ำยาจระเข้
ขจัดคราบตะไคร่น้ำ
Crocodile Moss Remover

จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

ขจัดคราบตะไคร่น้ำ



คุณสมบัติ
มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดเชื้อรา, ตะไคร่น้ำ, สาหร่าย, และพืชสีเขียวที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวต่างๆ และยังสามารถใช้ทำความสะอาดคราบเชื้อราในสระว่ายน้ำได้ดีอีกด้วย

ข้อแนะนำการใช้

อัตราส่วนผสม
สำหรับฉีดพ่นบนผนัง 1 : 500
สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค 1 : 1,000
สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ 500 ซีซี
ต่อน้ำในสระ 100 คิวบิกเมตร

การใช้งาน
1. ผสมน้ำยา"น้ำยาขจัดตะไคร่น้ำจระเข้" ตามสัดส่วนที่เหมาะสม ในกรณีต้องการขจัดคราบจำนวนมากสามารถใช้ โดยไม่ต้องผสมน้ำ
2. เทหรือฉีดพ่นลงพนพื้นที่ที่ต้องการขจัดคราบ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
3. ล้างออกด้วยน้ำสะอาด โดยใช้แปรงขัดออก ควรทำซ้ำในกรณีที่คราบยังคงกำจัดไม่หมด

www.Jorakay.co.th

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :
102 ซ.พระรามเก้า 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386

น้ำยาจระเข้

ขจัดคราบตะไคร่น้ำ

Crocodile Moss Remover

จระเข้ Innovation for Your Family's Happiness TILING INNOVATION

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

alkylbenzyldimethylammonium chloride 5 < 10 %
Isopropylic Alcohol 1 - 2.5 %
PH.8

ข้อควรระวัง

- ห้ามรับประทาน
- อย่าให้เข้าตาหรือถูกผิวหนัง
- สวมเครื่องป้องกันทุกครั้งที่ใช้
- ห้ามทิ้งน้ำยา หรือภาชนะบรรจุลงแหล่งน้ำ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- **ทางการเข้าตา** ล้างตาด้วยน้ำเปล่าจำนวนมากทันที และกรอกตาขึ้นลง หากใส่คอนแทคเลนส์ ควรถอดอย่างระมัดระวัง และล้างตาด้วยน้ำเปล่าต่ออย่างน้อย 20 นาที และควรปรึกษาแพทย์
- **ทางการสูดดม** เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่โล่งและอากาศถ่ายเท หากยังมีควันฟุ้งจากสารเคมี ควรสวมใส่หน้ากาก ในกรณีหมดสติ ควรจัดท่าทางผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสม คลายกระดุมเสื้อหรือเนคไทด์ ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในสถานที่ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเท และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที
- **ทางผิวหนัง** ล้างสิ่งปนเปื้อนจากผิวหนังด้วยน้ำจำนวนมาก ล้างสารที่ปนเปื้อนเสื้อผ้าด้วยน้ำ และควรสวมถุงมือ ควรล้างน้ำเป็นระยะเวลา 20 นาที ซักเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนนำมาสวมใส่
- **ทางปาก** ล้างปาก ถอดฟันปลอมหากมี และดื่มน้ำตามในปริมาณพอสมควร และควรหยุดหากผู้ป่วยมีอาการอยากอาเจียน หากผู้ป่วยมีอาการอาเจียน ควรจัดท่าให้ศีรษะอยู่ต่ำ เพื่อปกป้องไม่ให้สารพิษเข้าสู่ปอด ไม่ควรนำสิ่งต่างๆใส่ปากผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีอาการหมดสติ ควรเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยไปที่อากาศปลอดโปร่งและถ่ายเท คลายกระดุมเสื้อ และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที

การเก็บรักษา

เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และ สัตว์เลี้ยง ควรจัดเก็บให้พ้นแสงแดด สามารถจัดเก็บที่อุณหภูมิห้อง

การบรรจุ

ขนาด	พื้นที่ (ไม่ผสมน้ำ)
0.5 ลิตร	2 ตร.ม.
3.0 ลิตร	12 ตร.ม.
10.0 ลิตร	40 ตร.ม.
20.0 ลิตร	80 ตร.ม.